

# Die Amaryllis

auch Ritterstern genannt

Die Amaryllis, auch Ritterstern genannt, ist eine zur Weihnachtszeit beliebte subtropische Zwiebelblume; damit sie jedes Jahr zu Weihnachten ihre prächtigen Blüten öffnet, ist eine sehr spezielle Pflege notwendig.



Die subtropischen Rittersterne zählen wie Tulpen und Hyazinthen zu den Zwiebelblumen. Ihr Lebenszyklus unterscheidet sich von dem der "normalen" Zimmerpflanzen: Er ist eine Anpassung an die Wechsel zwischen Regen- und Trockenzeiten in ihrer Heimat. Auf die Blühphase im Winter folgt die Wachstumsphase im Frühling und Sommer. Ab dem Spätsommer beginnt dann die Ruhephase, die bis Anfang Dezember dauert. Damit

Rittersterne auch als Zimmerpflanzen regelmäßig blühen, müssen Sie diesen Rhythmus mit entsprechenden Pflegemaßnahmen wie folgt simulieren.

Während der Blühphase im Dezember/Januar wird die Pflanze weiterhin mäßig gegossen. Am längsten halten die Blüten an hellen, nicht zu sonnigen Plätzen bei 18-20 °C

Zimmertemperatur. Ca. ab Februar verwelken die Blüten welche in der Folge abgeschnitten werden. Ab März/April gießen Sie häufiger und halten Sie die Pflanze etwas wärmer, damit sich die Blätter gut entwickeln. Während dieser Wachstumsphase geben Sie alle ein bis zwei Wochen Flüssigdünger ins Gießwasser und stellen Sie die Pflanzen am besten an einen halbschattigen Platz ins Freie. Eine gute Versorgung mit Tageslicht, Wasser und Nährstoffen ist jetzt wichtig, da in der Zwiebel bereits die neuen Blüten angelegt werden. Ab August stellen Sie jetzt das Gießen ein und lassen Sie das Laub welken, damit die Pflanze in die Ruhephase übergeht. Im September/Oktober schneiden Sie die eingetrockneten Blätter ab und lassen Sie die Zwiebel bei etwa 15 °C in trockener Erde ruhen. Sie kann jetzt auch dunkel stehen, zum Beispiel im Keller.

Ab Ende November pflanzen Sie die Zwiebel um und lassen Sie sie etwa zur Hälfte aus der frischen Erde heraus schauen. Tipp: Wenn die Pflanze Brutzwiebeln gebildet hat, können Sie diese jetzt abnehmen und zur Vermehrung separat einpflanzen. Die jungen Zwiebeln brauchen ein paar Jahre, bis sie groß genug sind, um eigene Blütenstiele zu bilden. Sie beginnen mit dem mäßigen Gießen und stellen die Pflanze hell und zimmerwarm auf. Drehen Sie den Topf auf der Fensterbank alle paar Tage um 180 Grad, damit der Blütenstiel sich nicht zu stark zum Licht neigt. Um die Weihnachtszeit werden Sie sich an der erneuten Blüte erfreuen.